

IMPORTANTE!

Se você recebeu duas doses da vacina ao longo da vida, já está imunizado.



Para mais informações acesse

www.saude.mg.gov.br/febreamarela



SECRETARIA DE SAÚDE



CONTRA A FEBRE AMARELA, A VACINA É SUA MAIOR PROTEÇÃO.



CONHEÇA MAIS SOBRE A DOENÇA E SAIBA COMO SE PREVENIR.



O QUE É A FEBRE AMARELA?

É uma doença infecciosa grave causada por um vírus e transmitida pela picada dos mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes* na área silvestre e pelo *Aedes aegypti* na área urbana. A transmissão pode ocorrer tanto na área urbana quanto em regiões rurais e silvestres.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE A FEBRE AMARELA SILVESTRE E A FEBRE AMARELA URBANA?

A diferença é o mosquito transmissor. Na cidade, a doença é transmitida pelo *Aedes aegypti*, que também transmite os vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Na área silvestre, os transmissores são os mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*. No Brasil não há casos registrados de febre amarela urbana desde 1942.



COMO A FEBRE AMARELA SILVESTRE É TRANSMITIDA?

Por meio da picada dos mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*, comuns em matas e na vegetação na beira dos rios. Quando esses mosquitos picam um macaco doente, eles se tornam capazes de transmitir o vírus ao homem e a outros macacos.



QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ÁREAS DE RISCO?

Regiões nas proximidades de matas e rios, já que são esses os locais onde o vírus, seus hospedeiros (macacos) e vetores (mosquitos) existem.



A FEBRE AMARELA PODE SER TRANSMITIDA DE PESSOA PARA PESSOA?

Não, a única forma de contágio é por meio da picada do mosquito infectado.



QUALQUER PESSOA PODE CONTRAIR A DOENÇA?

Sim, qualquer pessoa que não estiver vacinada, independentemente da idade ou sexo, pode contrair a doença. Se você já recebeu duas doses da vacina ao longo da vida, você já está imunizado.



APÓS A PICADA DO MOSQUITO, QUANTO TEMPO LEVA PARA A DOENÇA SE MANIFESTAR?

Os sintomas surgem de 3 a 6 dias após o momento da infecção.



QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA FEBRE AMARELA?

Os principais sintomas são **febre alta, dores na cabeça e no corpo, náuseas e vômitos**. Não use medicamentos sem recomendação médica.



CASO APRESENTE ESSES SINTOMAS, O QUE DEVO FAZER?

Procure a unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem realizada para área rural, silvestre ou de mata nos últimos 15 dias.



COMO É O TRATAMENTO DA DOENÇA?

Não há um tratamento específico para a febre amarela. Os sintomas é que são tratados, como a febre e as dores. É importante que o paciente seja observado de perto, permaneça em repouso e, se necessário, faça a reposição de líquidos e de perdas sanguíneas que podem ocorrer.



COMO PREVENIR A DOENÇA?

Basta tomar a vacina, que é distribuída gratuitamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. Inclusive, em estados considerados de alto risco, como em Minas Gerais, a vacina já faz parte do Calendário Básico de Vacinação.



QUEM DEVE TOMAR A VACINA?

A recomendação é que as pessoas que moram em regiões silvestres, rurais, de mata ou que viajam para esses lugares sejam vacinadas, ao menos dez dias antes da viagem. Os meses de dezembro a maio, pelo clima propício para a reprodução dos mosquitos, registram o maior número de casos. Lembramos que todos devem tomar duas doses da vacina ao longo da vida para ficarem imunizados.



QUEM NÃO PODE TOMAR A VACINA?

Bebês com menos de seis meses de idade, pessoas com baixa imunidade (causada por doença ou algum tipo de tratamento), e pessoas que têm alergia a ovos e derivados.



ONDE POSSO ME VACINAR?

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de você.



O QUE DEVO LEVAR PARA QUE EU POSSA SER VACINADO?

Leve seu cartão de vacinação ou, caso não possua, leve um comprovante de endereço atualizado para realizar seu cadastro no SUS.



PERDI MEU CARTÃO DE VACINAÇÃO OU NÃO ME LEMBRO QUANDO FUI VACINADO PELA ÚLTIMA VEZ. O QUE DEVO FAZER?

No caso de não possuir o cartão de vacinação e nem se lembrar de quando tomou a última dose da vacina, a recomendação é procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.



QUE TIPO DE REAÇÃO A VACINA PODE PROVOCAR?

Pode ocorrer dor na região do corpo onde ela foi aplicada, além de febre e mal estar, mas esses efeitos são raros.



AO SAIR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÁ ESTOU IMUNIZADO?

Não. Por este motivo, é muito importante se vacinar dez dias antes de viajar para área rural, silvestre ou de mata.



DEPOIS DE SER VACINADO, POR QUANTO TEMPO FICAREI PROTEGIDO DA FEBRE AMARELA?

A partir da segunda dose, o efeito de proteção da vacina dura por toda a vida. Desde dezembro de 2014, o Ministério da Saúde não orienta mais o reforço da vacina da febre amarela a cada 10 anos.

Se você ou alguém da sua família ainda não tomou a vacina da febre amarela, procure a unidade de saúde mais próxima.