



هنا تحصلون على معلومات اوفى حول الموضوع:

■ دائرة الصحة في منطقتكم/ دائرة الصحة
■ قسم الصحة في منطقة هانوفر، مكتب الاستشارات الخاص
بمرض السل. الموقع الالكتروني: www.hannover.de
(> Leben in der Region Hannover > Gesundheit > Gesundheitsschutz
> Tuberkulose)

تلفون الاستشارات: 0511-616-22888

■ مستشفى مدينة هانوفر الجامعي، قسم امراض الرئة لدى الأطفال،
الحساسية و امراض الأطفال حديثوا الولادة. موقع الكتروني:

← www.mhh.de

(> Kliniken > Zentrum Kinderheilkunde und Jugendmedizin >
Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und
Neonatologie)

تلفون الاستشارات: 0511-532-3251 / -3220

■ اللجنة الألمانية المركزية لمكافحة مرض السل (DZK)

موقع الكتروني: www.dzk-tuberkulose.de

الناشر:

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Roesebeckstr. 4-6
30449 Hannover
www.nlga.niedersachsen.de

التاريخ: يوليو 2013

بالتعاون مع:

قسم الصحة في منطقة هانوفر، مكتب استشارات امراض السل
مستشفى مدينة هانوفر الجامعي، قسم امراض الرئة لدى الأطفال،
الحساسية و امراض الأطفال حديثوا الولادة.

مصدر الصور:

© NLGA (Titelseite, S. 5), Anja Greiner Adam - Fotolia.com (S.
2 u. 5); Peter Polak - Fotolia.com (S. 5)



أمراض السل لدى الأطفال

معلومات للآباء والأمهات وأولياء الأمور



Niedersachsen

هناك الأطفال معرضون لخطورة اكبر للاصابة بمرض السل
مقابل الكبار. كلما صغر عمر الطفل ازداد احتمال اصابته
بمرض السل.

طفلي كان على اتصال بشخص مصاب بالسل،

ما العمل؟

الحصول على استشارة من مكتب الصحة في منطقتك

يتم ابلاغ اسماء جميع الأشخاص المصابون بالسل لمكتب الصحة. يقوم مكتب الصحة في اسرع الأجال بالاتصال بكم. وإذا كان لديك استفسارات اضافية فيمكنكم اللجوء الى طبيب الأطفال الخاص بكم.

الوقاية من المرض

الأطفال الذين تحت سن 5 سنوات وكان لهم احتكاك بمرضى السل، يجب القيام بفحصهم فورا وعلاجهم بمساعدة الأدوية لحمايتهم من المرض. لدى هذه الفئة العمرية هناك ضرورة ليتم فحصهم مجددا بعد 8 وحتى 12 اسبوعا من الاصابة.

لدى الأطفال الأكبر سنا، فان هناك ضرورة للعلاج الفوري، تبعا لدرجة الخطورة. وهنا يتم بعد 6 الى 8 اسابيع من الاحتكاك بمصاب بمرض السل الفحص للتأكد من وجود العدوى من عدمها.

العلاج من خلال طبيب أخصائي

بعد تلقي الاستشارة والنصيحة من مكتب الصحة، تتم معالجة طفلكم في العادة من قبل طبيب الأطفال خاصتكم او في المستشفى.

الأجراء الأكثر نجاعة للوقاية من مرض السل، هو العلاج الدوائي الوقائي.

كيف يمكن ان تنتقل العدوى وكيف يمكن التعرف

على الاصابة بالعدوى؟

من خلال السعال او الرشح او الحديث الذي يقوم به المصاب بالسل يمكن ان تنتقل البكتيريا في الهواء وتنتشر الى اشخاص آخرين الموجودون بالقرب من المصاب يقومون بأخذها عبر التنفس (ما يسمى عدوى القطرات).

اكتشاف العدوى لدى من يصاب بمرض السل يتم التاكد منها قطعيا بعد 6 الى 8 اسابيع من الاصابة بها. ولهذا الغرض يتم القيام بفحص للجلد او للدم.

ولأن بكتيريا السل تنمو ببطيء، فان المرض وآلمه غالبا ما تظهر بعد شهور عديدة وحتى سنوات من الاصابة. هناك ايضا احتمال ان لا يظهر المرض اطلاقا، بالرغم من العدوى.

تشخص الاصابة بمرض السل، يتم من خلال التصوير الشعاعي للرئة ومن خلال فحص لاكتشاف بكتيريا السل في افرازات الشعب الهوائية. لدى الاطفال يتم غالبا فحص العصارة المعدية لاكتشاف بكتيريا المرض.



ما هو مرض السل؟

يعتبر مرض السل من الأمراض المعدية التي تتسبب بها البكتيريا المسماة (مايكوبكتيريا).

يتعلق الأمر بمرض بالغ الخطورة، يمكن ان يقود الى الوفاة، اذا لم تتم معالجته.

غالبا ما تصاب الرئة بالسل، ولكن يمكن ان تصاب اعضاء اخرى في الجسم بهذا المرض. هناك خطورة عالية بالاصابة بالمرض لدى الأطفال، اضافة لخطر الاصابة بنوع آخر من السل يسمى التهاب السحايا (التهاب غشاء الدماغ).

لا يوجد أعراض نموذجية للاصابة بالمرض لدى بدايته. المؤشرات لبدايته هي كما يلي:

- السعال
- حصى
- شعور بالاعياء والتعب
- نقص في الوزن
- التعرق الليلي

اذا تبين ان هناك اصابة بالمرض لدى شخص، فان القانون يحتم الابلاغ عن ذلك لدى مكتب الصحة. يقوم مكتب الصحة بالبحث عن الاشخاص القريبين من المصاب تبعا للأئحة تعليمات معينة. وبهذا يتم منع انتشار المرض.

الأطفال الصغار المصابون بالمرض لا يتسببون عادة بانتقال العدوى الى الآخرين، لأن سعالهم ليس قويا كما الكبار.