

Définitions standards des cas recommandées. Guide SIMR 2011

Maladies, affections prioritaires et événements de santé publique	
1. Choléra	Déshydratation grave ou décès suite à une diarrhée aqueuse aiguë chez un patient âgé de plus de 5 ans. S'il y a une épidémie de choléra, on suspectera un cas chez tout individu âgé de plus de 5 ans présentant une diarrhée aqueuse aiguë, avec ou sans vomissement.
2. Coqueluche	Toute personne présentant une toux pendant au moins 2 semaines avec au moins un des signes suivants : accès de toux (quintes), reprise inspiratoire, vomissement après la toux, c'est-à-dire déclenchement immédiatement par la toux sans autre cause apparente.
3. Décès maternel	Mort d'une femme pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les 42 jours suivant la fin de la grossesse quel que soit le site ou l'âge de grossesse, de toute cause liée ou aggravée par la grossesse ou sa gestion, mais pas de cause accidentelle ou incidente
4. Diarrhée sanglante	Toute personne souffrant de diarrhée avec présence de sang visible dans les selles
5. Dracunculose	Sujet présentant une ou plusieurs lésions cutanées avec émergence d'un ou de plusieurs vers de Guinée (Chaque sujet ne doit être comptabilisé qu'une fois au cours d'une même année civile)
6. Fièvre jaune	Toute personne présentant une brutale montée de fièvre, avec apparition d'un ictère dans les 14 jours suivant l'apparition des premiers symptômes.
7. Fièvres hémorragiques virales	Toute personne souffrant d'une forte fièvre qui ne répond à aucun traitement des causes habituelles de fièvre dans la région, et qui présente au moins l'un des signes suivants : diarrhée sanglante, hémorragie gingivale, hémorragies cutanées (purpura), injection des conjonctives et présence de sang dans les urines.
8. Fièvre typhoïde	Apparition progressive d'une fièvre persistante s'intensifiant, accompagnée de frissons, de malaises, de céphalées, de maux de gorge, de toux, et parfois, de douleurs abdominales et de constipation ou de diarrhée.
9. Infections Respiratoires Aiguës(IRA)	Infection respiratoire aiguë sévère (personne âgée de plus de 5 ans) : Toute personne gravement malade présentant les manifestations d'une infection aiguë des voies respiratoires inférieures avec : ▣ Apparition brutale de fièvre (>38°C), et toux ou maux de gorge ,et Souffle court ou difficulté à respirer, avec ou sans observations cliniques ou radiologiques de pneumonie OU Toute personne décédée d'une affection respiratoire inexpliquée.
10. Méningite	Toute personne présentant une forte fièvre d'apparition brutale (température rectale >38,5°C ou axillaire >38,0°C) et l'un des signes suivants : raideur de la nuque, altérations de la conscience ou autres signes méningés.

11. Monkeypox	Toute personne présentant une fièvre élevée d'apparition brutale suivie après quelques jours d'une éruption vésiculo-pustuleuse prédominant à la face, aux paumes des mains ou au moins 5 cicatrices de type variolique
12. Paludisme	Fièvre accompagnée ou non de maux de tête, douleur lombaire, frissons, transpiration, myalgie, nausée, vomissements.
13. Peste	Toute personne qui présente une apparition rapide de fièvre, céphalées, état de malaise grave et prostration, et : <ul style="list-style-type: none"> - Pour la peste bubonique : gonflement très douloureux des ganglions (bubons) ; - Pour la peste pulmonaire : toux avec expectorations teintées de sang, douleurs dans la poitrine et respiration difficile.
14. Paralysie Flasque Aiguë	Tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aiguë ou toute personne souffrant de paralysie, quel que soit son âge, chez laquelle le médecin soupçonne une poliomyélite.
15. Rage	Toute personne ayant été en contact avec un animal suspecté enragé et présentant au moins l'un des signes suivants: céphalées, douleurs dans la nuque, nausées, fièvre, hydrophobie, anxiété, agitation, sensations de picotement anormales ou douleurs à un site de morsure.
16. Rougeole	Toute personne présentant de la fièvre, une éruption généralisée maculopapulaire (non vésiculaire) et de la toux ou un rhume ou une conjonctivite (yeux rouges), ou toute personne chez laquelle un médecin soupçonne une rougeole.
17. Tétanos néonatal	Tout nouveau-né capable de pleurer et de prendre le sein normalement pendant les 2 premiers jours de sa vie, et qui, entre le 3ème et 28ème jour, ne peut plus téter normalement, devient raide et/ou a des convulsions.

Principaux signes et symptômes utilisés pour les définitions des cas au niveau de la communauté

Il faut informer les parties concernées (chefs de communauté, agents de santé communautaires, praticiens, accoucheuses et personnels de santé travaillant sur le terrain dans les zones reculées) des maladies et affections prioritaires sous surveillance dans leur région. Utiliser pour les définitions des cas au niveau de la communauté les principaux signes et symptômes décrits ci-dessous. La communauté saura ainsi reconnaître les cas de maladie, orienter les personnes atteintes sur un traitement et les signaler à la formation sanitaire.

Principaux signes et symptômes utilisés pour les définitions des cas au niveau de la communauté	
Choléra	Selles liquides, abondantes et fréquentes chez plus de 5 ans
Coqueluche	Tout enfant présentant une toux saccadée avec ou sans vomissements
Décès maternel	Toute femme enceinte décédée avant, pendant ou après l'accouchement
Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans	Au moins 3 selles liquides ou aqueuses au cours de dernières 24 heures, avec ou sans signe de déshydratation
Diarrhée sanglante (<i>Shigella</i>)	Diarrhée avec présence de sang visible dans les selles
Dracunculose (Ver de Guinée)	Toute personne présentant une lésion cutanée accompagnée de démangeaisons ou de cloques
Fièvre Jaune	Tout individu atteint de fièvre et dont le blanc des yeux ou la peau jaunit.
Fièvres hémorragiques virales	Maladie inexplicite s'accompagnant de fièvre et de saignements ou décès des suites d'une maladie grave inexplicite s'accompagnant de ces mêmes symptômes
Fièvre typhoïde	Fièvre persistante depuis au moins 3 semaines
Pneumonie chez les moins de 5 ans/IRA	Toux, souffle court ou difficultés respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans
Méningite à méningocoque	Fièvre accompagnée d'une raideur du cou
Monkeypox	Fièvre avec éruption cutanées prédominant à la face, aux paumes des mains et plantes des pieds
Paludisme	Fièvre en zone d'endémie pour le paludisme Forte fièvre accompagnée d'un signe de danger* chez les enfants de moins de 5 ans <i>(*Signes de danger : léthargie, perte de connaissance, vomissements, convulsions et, chez les enfants de moins de 5 ans, incapacité à boire ou à prendre le sein)</i>
Peste	Tuméfaction douloureuse sous les bras ou dans la région de l'aîne. Dans une région où sévit la peste, toute personne souffrant de toux, de douleurs à la poitrine et de fièvre

Paralyse flasque aiguë (PFA)	Tout enfant âgé de moins de 15 ans qui marchait, rampait et bougeait, et qui ne marche plus ou toute personne présentant brusquement une faiblesse d'un des membres
Rage	Notion d'une morsure d'un animal accompagnée d'angoisse, maux de tête, fièvre, malaises et sensations anormales très souvent au site d'une morsure par un animal domestique ou sauvage. L'agitation est l'hydrophobie le symptôme fréquent.
Rougeole	Fièvre accompagnée d'une éruption cutanée
Tétanos néonatal	Tout nouveau-né normal à la naissance qui, 2 jours plus tard, est incapable de téter ou de s'alimenter.