

Prévention




L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme
À Madagascar (EIPMD) 2011

- **Disponibilité et utilisation des moustiquaires**
- Aspersión intradomiciliaire d'insecticide résiduel (AID)

Disponibilité de MID*

Pourcentage de ménages possédant :




*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

Disponibilité de MID

selon le niveau du bien-être économique

Pourcentage de ménages possédant au moins une MID




*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

Possession de MID selon les faciès de transmission du paludisme

Madagascar
80 %

Pourcentage de ménages avec au moins une MID



Équatorial
95 %

*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable


Subdésertique
93 %

■ Zone non enquêtée

Possession de MID selon les faciès opérationnels

Madagascar
80 %

*Pourcentage de ménages
avec au moins une MID*



*MID: Moustiquaire Imprégnée
d'insecticide à efficacité Durable

Possession de MID par les zones d'intervention

MID

Madagascar

80 %


Pourcentage de ménages avec au moins une MID

Districts ciblés
94 %

Districts non-ciblés
17%


*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

■ Zone non enquêtée



Source d'obtention des MID

Répartition des ménages qui possèdent au moins une MID par source d'obtention de la moustiquaire



*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

Utilisation des MID par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une MID la nuit ayant précédé l'enquête

Dans tous les ménages

77



Enfants

72



Femmes
enceintes

Dans les ménages avec au moins une MID

91



Enfants

89




Femmes
enceintes

*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

Utilisation des MID et aspersion intradomiciliaire d'insecticide résiduel (AID)

Pourcentage ayant dormi sous une MID la nuit dernière ou dans un logement pulvérisé contre les moustiques au cours des 12 derniers mois



Population des ménages

Enfants moins de 5 ans


Femmes enceintes de 15-49
ans

*MID: Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable

- Disponibilité et utilisation des moustiquaires
- **Aspersion intradomiciliaire d'insecticide résiduel (AID)**


Aspersions intradomiciliaires d'insecticide résiduel (AID) dans les districts CAID

Pourcentage de ménages dont l'intérieur du logement a été pulvérisé avec un insecticide résiduel au cours des 12 derniers mois




Source d'aspersion intradomiciliaire d'insecticide résiduel (AID)

Répartition (en %) des ménages dont les murs intérieurs des logements ont été pulvérisés par source d'aspersion



Caractéristiques de l'Aspersion intradomiciliaire d'insecticide résiduel (AID)

Parmi les ménages dont le logement a été pulvérisé au cours des 12 derniers mois, pourcentage



Principaux résultats

- **80 %** de ménages possèdent une Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à efficacité Durable (MID)
- **77 %** de enfants de moins de cinq ans et **72 %** des femmes enceintes de 15-49 ans **ont dormi sous une MID la nuit ayant précédé l'enquête**
- **79 %** de ménages dans les districts ciblés CAID dont **l'intérieur du logement a été pulvérisé avec un insecticide résiduel au cours des 12 derniers mois**