


# Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados

## RESULTADOS PRINCIPALES

MICS  
Paraguay  
2016



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS



SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



# I. Introducción

---

Este informe se basa en los resultados de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS por sus siglas en inglés) de Paraguay realizada en 2016. La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, MICS PARAGUAY, fue realizada en el 2016 por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y suministraron apoyo financiero y técnico; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

UNICEF desarrolló el programa global de MICS en el decenio de 1990, como un programa internacional de encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de indicadores sobre la situación de niños, niñas y mujeres. A nivel global, las encuestas MICS se han implementado en más de 100 países permitiendo el monitoreo integral de un conjunto de indicadores que los países pueden usar en políticas públicas, programas y monitoreo de compromisos acordados internacionalmente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La información que ofrece MICS permite que el Paraguay, actualice y/o llene vacíos en datos relativos a salud infantil, nutrición, educación, violencia, abuso y maltrato contra los niños y niñas, salud sexual y reproductiva.

El presente material incluye los principales resultados de la MICS Paraguay 2016. Para obtener información detallada sobre los hallazgos de la encuesta según características demográficas, sociales, económicas y culturales, puede visitar <http://www.dgeec.gov.py>, <https://www.unicef.org> y <https://www.childinfo.org>



# RESUMEN DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES

## Implementación de la encuesta

Marco de la muestra	Pre- Censo de Población y Viviendas 2012 (hogares no indígenas) y Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas 2012 (hogares indígenas)	Cuestionarios	Hogar Mujeres (15-49 años de edad) Niños y niñas menores de cinco años Calidad del agua en el hogar.
- Actualizado	Abril a julio de 2016		
Capacitación de los entrevistadores	Mayo – Junio 2016	Trabajo de campo	Junio – Setiembre 2016
Resumen de la muestra			
<b>Hogares</b>		<b>Niños y niñas menores de cinco años</b>	
- Muestreados	8.008	- Elegibles	4.764
- Ocupados	7.594	- Madres/ cuidadoras entrevistadas	4.625
- Entrevistados	7.313	- Tasa de respuesta (porcentaje)	97,1
- Tasa de respuesta (porcentaje)	96,3	<b>Calidad del agua (hogares)</b>	
<b>Mujeres</b>		- Seleccionados para la prueba en hogares ocupados	1.814
- Elegibles para las entrevistas	7.853	- Con prueba de agua realizada	1.790
- Entrevistadas	7.311	- Tasa de respuesta (porcentaje)	98,7
- Tasa de respuesta (porcentaje)	93,1		

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Población de la encuesta

Tamaño medio del hogar	3,9	Porcentaje de población que vive en	
Porcentaje de población menor de:		Áreas urbanas	62,5
- 5 años de edad	9,9	Áreas rurales	37,5
- 18 años de edad	35,4	Asunción	7,6
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron al menos un nacido vivo en los 2 últimos años	15,7	San Pedro	6,2
		Central	29,5
		Caaguazú	7,3
		Alto Paraguay	0,3
		Boquerón	1,6
		Alto Paraná	12,2
		Itapúa	7,7
		Resto	27,6

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Características de la vivienda

Porcentaje de hogares con	
- Electricidad	98,4
- Piso terminado	87,1
- Techo terminado	96,3
- Paredes terminadas	93,4
Número promedio de personas por habitación utilizadas para dormir	2,0

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Bienes personales o del hogar

Porcentaje de hogares que poseen	
- Un televisor	89,3
- Una Heladera/Refrigerador	87,1
- Tierra de uso agrícola	23,1
- Animales de granja/ganado	40,9
Porcentaje de hogares en los que al menos un miembro tiene o posee	
- Teléfono celular	95,6
- Auto o camión	33,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## MORTALIDAD INFANTIL


### Mortalidad en la primera infancia<sup>A</sup>

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor	
1.1	ODS 3.2.2	Tasa de mortalidad neonatal	Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.	6
1.2		Tasa de mortalidad infantil	Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año.	17
1.3		Tasa de mortalidad post-neonatal	Diferencia entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal.	11
1.4		Tasa de mortalidad de niños y niñas	Probabilidad de morir entre el primer y el quinto aniversario.	1
1.5	ODS 3.2.1	Tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años	Probabilidad de morir entre el nacimiento y antes de cumplir el quinto año.	19

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

<sup>A</sup> Los valores del indicador son de 1.000 nacidos vivos y se refieren al periodo de cinco años anterior a la encuesta.

**Figura 1: Tasas de mortalidad en la primera infancia, MICS Paraguay, 2016**



Nota: los valores del indicador corresponden a 1.000 nacidos vivos

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## NUTRICIÓN




### Estado nutricional<sup>ii</sup>

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
2.1a	Prevalencia de bajo peso (underweight)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y severa)	1,3
2.1b		(b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto al peso mediano por la edad del estándar de la OMS.	0,3
2.2a	ODS 2.2.1 Prevalencia de baja talla para la edad (stunting)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y severa)	5,9
2.2b		(b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la altura mediana por la edad estándar de la OMS.	1,3
2.3a	ODS 2.2.2 Prevalencia de emaciación (wasting)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y severa)	1,0
2.3b		(b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto al peso mediano por la altura estándar de la OMS.	0,4
2.4	ODS 2.2.2 Prevalencia de sobrepeso	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que están por encima de dos desviaciones estándar con respecto al peso mediano por la altura estándar de la OMS.	12,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

**Figura 2: Bajo peso, baja talla para la edad, emaciación y sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años (moderada y severa), MICS Paraguay 2016.**



Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016



## Alimentación de leche materna y alimentación de infantes

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
2.5	Niños y niñas que alguna vez fueron lactados	Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que lactaron en cualquier momento a su último hijo, hija nacido vivo.	96,6
2.6	Iniciación temprana con alimentación de leche materna	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2 últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido.	49,5
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que lactan exclusivamente <sup>iii</sup> .	31,3
2.8	Lactancia predominante en infantes menores de 6 meses	Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que lactan como fuente predominante de alimentación durante el día anterior <sup>iv</sup> .	54,1
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 15 meses alimentados con leche materna el día anterior.	48,2
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 20 y 23 meses alimentados con leche materna el día anterior.	21,0
2.11	Duración mediana de la lactancia	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños y niñas de entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior.	13,4
2.12	Lactancia materna apropiada para la edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados apropiadamente durante el día anterior <sup>v</sup> .	41,2
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.	87,1
2.14	Frecuencia de alimentación con leche en niños y niñas que no reciben leche materna	Porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 23 meses que no reciben lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche durante el día anterior.	91,7
2.15	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 23 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños y niñas no lactados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más <sup>vi</sup> durante el día anterior.	71,0
2.16	Diversidad alimentaria mínima	Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior <sup>vii</sup> .	70,4
2.17a	Alimentación mínima aceptable	(a) Porcentaje de niños y niñas amamantados de 6 a 23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior	35,2
2.17b		b) Porcentaje de niños y niñas no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos 2 tomas de leche y que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.	48,7
2.18	Alimentación con biberón	Porcentaje de niños y niñas de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior.	67,6

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Bajo peso al nacer

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
2.20	Recién nacidos con bajo peso al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer.	9,6
2.21	Recién nacidos pesados al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.	97,7

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016



## SALUD INFANTIL




### Vacunaciones

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
3.1	Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.	96,0
3.2	Cobertura de vacunación contra la polio	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna OPV (OPV3) antes de cumplir el primer año.	87,6
3.3 3.5 3.6	Cobertura de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos + hepatitis B + Haemophilus influenzae tipo B (Pentavalente)	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna Pentavalente antes de cumplir el primer año.	87,3
3.4	Cobertura de vacunación contra el sarampión	Porcentaje de niños y niñas de entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna contra el sarampión antes de cumplir el segundo año de vida.	83,1
3.7	Cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla	Porcentaje de niños y niñas de entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna contra la fiebre amarilla antes de segundo año de vida.	80,8
3.8	ODS 3.b.1 Cobertura de inmunización completa.	Porcentaje de niños y niñas de entre 24 y 35 meses que recibieron todas <sup>viii</sup> las vacunas recomendadas en el calendario nacional de vacunación antes de cumplir el primer año (y contra el sarampión, varicela, Hep A, fiebre amarilla e Influenza 2, antes de cumplir el segundo año).	10,3

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

**Figura 3: Vacunaciones a los 12 meses (contra el sarampión, varicela, Hepatitis A, fiebre amarilla e Influenza 2, a los 24 meses), MICS Paraguay, 2016**



Nota: los indicadores de MICS se muestran en negro.

(+) No aplica

Porcentaje

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Tétanos toxoide

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
3.9	Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz.	83,9

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Diarrea

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños y niñas con diarrea	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas.	10,9
3.10	Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un establecimiento de salud o por parte de un agente de salud.	52,9
3.11	Tratamiento de la diarrea con sobres de sales de rehidratación oral (SRO) y zinc	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron SRO y zinc.	3,5
3.12	Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continuada	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron TRO (paquete de SRO, SRO líquido pre-ensado, líquidos recomendados elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación continuada durante el episodio de diarrea.	59,4

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA)

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños y niñas con síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas.	12,6
3.13	Búsqueda de atención para niños y niñas con síntomas de IRA	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un establecimiento de salud o por parte de un agente de salud.	89,4
3.14	Tratamiento con antibióticos para niños y niñas con síntomas de IRA	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas que recibieron antibióticos.	54,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Uso de combustibles sólidos

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
3.15	Uso de combustibles sólidos para cocinar	Porcentaje de miembros del hogar en hogares que utilizan combustibles sólidos como fuente primaria de energía doméstica para cocinar.	36,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

# AGUA Y SANEAMIENTO

## Agua y saneamiento

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
4.1	Uso de fuentes de agua mejoradas para beber	Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber.	95,3
4.2	Tratamiento de agua	Porcentaje de miembros del hogar que usan agua no mejorada para beber y que utilizan un método de tratamiento apropiado.	13,3
4.3	ODS 6.2.1 Uso de saneamiento mejorado	Porcentaje de miembros del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas que no están compartidas	80,3
4.4	Eliminación segura de las heces de los niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 2 años cuya última deposición se eliminó de manera segura.	22,2
4.5	ODS 6.2.1 Lugar para el lavado de manos	Porcentaje de hogares con un lugar específico para el lavado de manos donde se dispone de agua, jabón u otro agente para la limpieza.	81,5
4.6	Disponibilidad de jabón u otro agente para la limpieza	Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para la limpieza.	87,5
4c1	Contaminación fecal del agua para beber de los hogares	Porcentaje de miembros de los hogares con presencia de <i>E. coli</i> en el agua para beber <sup>1</sup>	47,6
4c2	Contaminación fecal de la fuente de agua	Porcentaje de miembros de los hogares con presencia de <i>E. coli</i> en la fuente de agua para beber <sup>1</sup>	37,5
4c3	ODS 6.1.1 Uso de agua para beber gestionada de forma segura	Porcentaje de la población del hogar con una fuente de agua mejorada dentro de la vivienda, patio o lote, sin <i>E. coli</i> y disponible en cantidades suficientes <sup>1</sup>	53,2
4c4	Disponibilidad de agua para beber	Porcentaje de la población del hogar con agua para tomar disponible en cantidades suficientes	83,2
4c5	ODS 6.2.1 Vaciado de instalaciones sanitarias in situ	Porcentaje de miembros del hogar con letrina de fosa, cámara séptica o pozo ciego vaciados en los últimos 5 años	15,1

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

<sup>1</sup>Las pruebas de aguas realizadas en la Encuesta MICS de Paraguay utilizó la metodología recomendada por el Grupo de Monitoreo Conjunto formado por UNICEF y la OMS (Joint Monitoring Programme- JMP) para la medición de la calidad del agua a través de encuestas de hogares. Aplicadas en 8 países<sup>1</sup>. Esta prueba será utilizada en 2018 en Honduras, Costa Rica, Surinam y Argentina.


La utilización de filtros de membrana para la detección de la presencia de coliformes (Membrane filter method). Por su simplicidad y su precisión, se considera un método adecuado para la medición agregada en el contexto de encuestas de hogares, pero no pretende ser sustitutivo de pruebas más exactas y fiables como las que se realizan en laboratorios a nivel nacional y que poseen equipamiento más especializado.

Los últimos reportes de calidad de agua a nivel país son del 2010 provenientes de la Evaluación Rápida de la Calidad de Agua (ERCA)<sup>2</sup>, por lo que este informe podría constituirse en línea de base para futuros estudios.

<sup>1</sup> Bangladesh, Nepal, República Democrática del Congo, Ghana, Costa de Marfil y Ecuador.

<sup>2</sup> ERCA, Evaluación Rápida de Calidad de Agua de consumo en el país – Paraguay (RADWQ). Carmen Vargas García, consultora. Noviembre de 2010".

**Figura 4: Uso de agua y saneamiento mejorados en áreas urbanas y rurales, MICS Paraguay 2016.**



Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016



## SALUD REPRODUCTIVA

### Anticoncepción y necesidad no satisfecha


Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor	
-		Tasa global de fecundidad	Tasa global de fecundidad <sup>A</sup> de mujeres de entre 15 y 49 años de edad.	2,5
5.1	ODS 3.7.2	Tasa de natalidad entre adolescentes	Tasa de fecundidad específica <sup>A</sup> en mujeres de entre 15 y 19 años para el año antes de la encuesta.	72
5.2		Embarazos en edad temprana	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvieron al menos un nacido vivo antes de los 18 años.	14,8
5.3		Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo (moderno o tradicional).	68,4
5.4	ODS 3.7.1	Necesidad no satisfecha	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños y niñas que tengan y que actualmente no usan anticonceptivos.	12,1

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

<sup>A</sup>La tasa de fecundidad específica para cada grupo de edad se define como el número de nacidos vivos en un grupo de edad específico durante un periodo de tiempo determinado, dividido por el número promedio de mujeres en ese grupo de edad durante el mismo lapso de tiempo, expresado por 1.000 mujeres. La tasa de fecundidad específica para mujeres de 15 a 19 años de edad se denomina también tasa de natalidad entre adolescentes.

La tasa global de fecundidad (TGF) se calcula sumando las tasas de fecundidad para cada grupo de edad calculadas para los cinco grupos de edad de mujeres desde los 15 hasta los 49 años. El TGF denota el número promedio de niños y niñas a los que una mujer habrá dado a luz al final de su edad reproductiva (a los 50 años de edad) si prevalecen las tasas actuales de fecundidad.

**Figura 5: Uso de anticonceptivos, MICS Paraguay 2016.**



Métodos modernos	66,5
Inyectables	21,3
Píldora	19,0
Condón masculino	10,4
Esterilización femenina	8,8
DIU	6,1
LAM (MELA)	0,5
Esterilización masculina	0,1
Condón femenino	0,1
Diafragma/espuma/lubricante	0,2
Implantes	0,0

Métodos tradicionales	1,9
Abstinencia periódica	1,2
Retiro	0,3
Otro	0,4

Cualquier método	68,4
------------------	------

Sin método	31,6
------------	------

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Atención materna y del recién nacido

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
5.5a 5.5b	Cobertura de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron atendidas durante su último nacido vivo (a) al menos una vez por alguna persona capacitada (b) al menos cuatro veces por algún proveedor.	98,7 93,6
5.6	Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo como resultado un nacido vivo.	94,5
5.7	ODS 3.1.2 Asistencia en el parto por alguna persona capacitada	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo por personal de salud capacitado.	95,5
5.8	Partos institucionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo durante los 2 años anteriores a la encuesta y que dieron a luz en algún establecimiento de salud.	93,2
5.9	Cesárea	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta nació por medio de una cesárea.	45,9

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016




## Controles de salud post-natales

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
5.10	Estancia post-parto en un establecimiento de salud	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que permanecieron en un establecimiento de salud por 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.	97,6
5.11	Chequeos post-natales para el recién nacido	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un establecimiento de salud o en casa después del parto, o un chequeo postnatal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.	95,9
5.12	Chequeos post-natales para la madre	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un establecimiento de salud o en casa después del parto o un chequeo postnatal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su último nacido vivo en los 2 últimos años.	94,4

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016



**Figura 6: Lugar del parto y controles post-natales, MICS Paraguay 2016.**



Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## DESARROLLO INFANTIL

Desarrollo infantil			
Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
6.1	Asistencia a programas de educación infantil temprana	Porcentaje de niños y niñas de entre 36 y 59 meses que asisten a un programa de educación infantil temprana.	31,1
6.2	Apoyo al aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad con los cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela.	63,7
6.3	Apoyo paterno para el aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad cuyo padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	16,6
6.4	Apoyo materno para el aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad cuya madre biológica ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	43,2
6.5	Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles.	22,8
6.6	Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tienen dos o más juguetes.	59,5
6.7	Cuidado inadecuado	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que fueron dejados solos o al cuidado de otro niño, niña de menos de 10 años de edad durante más de una hora al menos en la última semana.	2,5
6.8 ODS 4.2.1	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje.	81,9
6.9s1	Pautas de interacción con el desarrollo del niño, niña de 0 a 11 meses <sup>xv</sup>	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 11 meses, cuyo padre/madre biológico/a u otra persona del hogar mayor a 15 años, interactúan con el/la durante la última semana en por lo menos dos de las siguientes actividades como: mirar, hablar, acariciar y darle de comer. (a) Interacción del Padre (b) Interacción de la Madre (c) Otra Persona	55,4 95,3 34,2
6.9s2	Pautas de interacción con el desarrollo del niño, niña de 12 a 23 meses <sup>xv</sup>	Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses, cuyo padre/madre biológico/a u otra persona del hogar mayor a 15 años, interactúan con el/la durante la última semana, participando en por lo menos dos de las siguientes actividades como: jugar, esconderse, trepar, jugar a que le sigan y que le alcancen. (a) Interacción del Padre (b) Interacción de la Madre (c) Otra Persona	26,8 46,7 30,5
6.9s3	Pautas de interacción con el desarrollo del niño, niña de 24 a 35 meses <sup>xv</sup>	Porcentaje de niños y niñas de 24 a 35 meses, cuyo padre/madre biológico/a u otra persona del hogar mayor a 15 años, interactúan con el/la durante la última semana, participando en por lo menos dos de las siguientes actividades como: conversar con el niño, niña sobre temas de su interés, nombrar objetos, colores, números u acciones. (a) Interacción del Padre (b) Interacción de la Madre (c) Otra Persona	37,1 69,4 30,1

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016




## ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN

Alfabetización y educación <sup>ix</sup>			
Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
7.1	Tasa de alfabetización entre jóvenes	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que pueden leer una oración simple y corta acerca de la vida diaria o que asistieron a la escuela secundaria o superior.	96,7
7.2	Preparación para la escuela	Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al preescolar durante el año anterior.	87,0
7.3	Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	Porcentaje de niños y niñas en edad de ingreso escolar que asiste a primer grado de la escuela primaria.	89,8
7.4	Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (ajustada)	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asisten a la escuela primaria o secundaria.	96,9
7.5	Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (ajustada)	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que actualmente asisten a la escuela secundaria o superior.	77,0
7.6	Niños y niñas que alcanzan el último grado de la escuela primaria	Porcentaje de niños y niñas que ingresan en el primer grado de la escuela primaria y que eventualmente alcanzan el último grado.	93,4
7.7	Tasa de terminación de primaria	Número de niños y niñas que asisten al último grado de la escuela primaria (excluyendo a los repitentes dividido por el número de niños y niñas en edad de completar la escuela primaria (edad apropiada al último grado de la escuela primaria)).	102,9
7.8	Tasa de transición a la escuela secundaria	Número de niños y niñas que asiste al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior que están en el primer año de escuela secundaria durante el año escolar actual dividido por el número de niños y niñas que cursa el último grado de la escuela primaria durante el último año escolar.	92,9
7.9	Índice de paridad de géneros (escuela primaria)	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela primaria de niños.	1,00
7.10	Índice de paridad de géneros (escuela secundaria)	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria de niños.	1,09

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

**Figura 7: Indicadores de educación por sexo, MICS Paraguay, 2016**



Nota: todos los valores de indicador constan en porcentajes y tasas

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## PROTECCIÓN INFANTIL

### Registro del nacimiento

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.1	ODS 16.9.1	Registro de nacimiento	93,0
Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016			


### Trabajo infantil

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.2	ODS 8.7.1	Trabajo infantil	26,4
Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016			

### Disciplina del niño, niña

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.3	ODS 16.2.1	Disciplina violenta	52,1
Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016			

**Figura 8: Método de disciplina del niño, niña de edades comprendidas entre 1 y 14 años, MICS Paraguay, 2016**



Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Matrimonio temprano

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.4	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad.	4,0
8.4a ODS 5.3.1	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad.	3,6
8.5	Matrimonio antes de los 18 años	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad.	21,0
8.5a ODS 5.3.1	Matrimonio antes de los 18 años	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad.	21,6
8.6	Jóvenes de entre 15 y 19 años que están actualmente casados o en unión	Porcentaje de mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años actualmente casadas o en unión.	16,1
8.8a 8.8b	Diferencia de edad entre los esposos	Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas. (a) en mujeres de entre 15 y 19 años (b) en mujeres de entre 20 y 24 años	15,9 17,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Actitudes hacia la violencia doméstica

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.1.2	Actitudes hacia la violencia doméstica	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños y niñas, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida.	6,0

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Entorno familiar de los niños y niñas

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
8.13	Entorno familiar de los niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años de edad que no viven con ninguno de los padres biológicos.	9,1
8.14	Prevalencia de niños y niñas con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos muertos.	4,1
8.15	Niños y niñas con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños y niñas de 0-17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.	5,4

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## VIH/sida Y COMPORTAMIENTO SEXUAL

### Conocimientos y actitudes sobre el VIH/sida

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
-	Ha oído hablar del sida	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han oído hablar del sida.	94,7
9.1	Conocimiento sobre la prevención del VIH entre los jóvenes	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente dos formas de prevenir la transmisión sexual del VIH <sup>xi</sup> y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH <sup>xii</sup>	27,5
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión del VIH <sup>xiii</sup> de madre a hijo.	41,2
9.3	Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que expresan aceptar actitudes para las cuatro preguntas <sup>xiv</sup> sobre las personas que viven con el VIH.	20,7

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

### Prueba del VIH

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
9.4	Personas que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH.	78,1
9.5	Personas que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	17,2
9.6	Jóvenes sexualmente activos que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales durante los 12 meses antes de la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	21,9
9.7	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre el VIH durante dichos cuidados.	44,5
9.8	Prueba del HIV durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados.	77,0

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Comportamiento sexual

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
9.9	Jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que nunca se han casado/unido ni han mantenido relaciones sexuales.	48,8
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en personas jóvenes	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.	10,0
9.11	Mezcla de edades de las parejas sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta con un compañero que era 10 años o más mayor.	12,0
9.12	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses.	2,3
9.13	Uso del preservativo durante la relación sexual con varios compañeros sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que informan haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos meses y que también informan de haber usado un preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.	51,3
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres sexualmente activas de entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo o pareja cohabitante en los 12 últimos meses.	33,1
9.15	Uso del preservativo con compañeros sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que informan haber usado un preservativo durante la relación sexual con su último compañero sexual que no era su esposo o pareja cohabitante, en los 12 últimos meses.	68,7

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## Huérfanos

Indicador de MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
9.16	Tasa de asistencia a la escuela por parte de huérfanos frente a la asistencia a la escuela por parte de niños y niñas no huérfanos	Proporción que asiste a la escuela entre niños y niñas de 10 a 14 años de edad que han perdido a ambos padres dividida por la proporción de los niños y niñas de 10 a 14 años de edad que asisten a la escuela y cuyos padres están vivos y que viven con uno de los padres o con ambos.	(*)

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

(\*) Datos se basan en menos de 25 casos no ponderados.

## ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

### Acceso a los medios de comunicación

Indicador MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
10.1	Exposición a los medios de comunicación	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que, por lo menos una vez a la semana, leen un diario o revista, escuchan la radio y ven la televisión.	34,7

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

### Uso de tecnologías de la información/comunicación

Indicador MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
10.2	Uso de computadoras	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que usaron una computadora durante los últimos 12 meses.	57,3
10.3	Uso de internet	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que usaron internet durante los últimos 12 meses.	85,4

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## BIENESTAR SUBJETIVO

### Bienestar subjetivo

Indicador MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
11.1	Satisfacción con la vida	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que están muy satisfechos o algo satisfechos con sus vidas en general.	94,3
11.2	Felicidad	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que son muy felices o algo felices.	92,6
11.3	Percepciones de una vida mejor	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años cuyas vidas habían mejorado durante el último año, y que esperan que sus vidas mejoren en un año.	61,3

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

### Consumo de tabaco

Indicador MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
12.1 ODS 3.a.1	Consumo de tabaco	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que fumaron cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo un día o más durante el último mes.	4,4
12.2	Consumo de tabaco antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que fumaron un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad.	2,5

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

### Consumo de alcohol

Indicador MICS <sup>i</sup>	Indicador	Descripción	Valor
12.3	Consumo de alcohol	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica un día o más durante el mes anterior a la encuesta.	34,5
12.4	Consumo de alcohol antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad.	5,7

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

## NOTA

<sup>i</sup>Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>. El Grupo de Trabajo Interagencial sobre Indicadores ODS actualiza continuamente los metadatos de muchos indicadores ODS y se realizan cambios en la lista de indicadores ODS. MICS cubre muchos indicadores ODS con una coincidencia exacta de sus definiciones, mientras que algunos indicadores son sólo parcialmente cubiertos por MICS. Estos últimos casos se incluyen aquí siempre y cuando la metodología internacional actual permita únicamente la forma en que se define el indicador MICS, y/o que el indicador MICS genere una parte significativa del indicador ODS. Para más información sobre los metadatos de los indicadores ODS, véase <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>.

<sup>ii</sup>Las mediciones de peso y de estatura/tallase completaron con éxito para el 95.7 y el 95.2 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años, respectivamente.

<sup>iii</sup>Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.

<sup>iv</sup>Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).

<sup>v</sup>Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños, niñas de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.

<sup>vi</sup>Niños y niñas lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses de edad, y tres veces para los niños y niñas de 9-23 meses de edad. Niños y niñas que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.

<sup>vii</sup>El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes 7 grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.

<sup>viii</sup>Según el esquema de vacunación en el país, la vacunación completa incluye lo siguiente: BCG, rotavirus 1 y 2, polio 1, 2 y 3, pentavalente (Difteria, Tos convulsa, Tétanos, Hepatitis B, Meningitis) 1, 2 y 3, neumococo 1 y 2 y Anti-Influenza 1 aplicadas antes de los 12 meses mientras que para sarampión, varicela, hepatitis a, fiebre amarilla, Anti-Influenza 2 suministrado antes de los 2 años de edad.

<sup>ix</sup>Los indicadores de educación, siempre que sean aplicables, se basan en información sobre asistencia escolar reportada (en cualquier momento a lo largo del año escolar) como proxy de matriculación.

<sup>x</sup>A los niños y niñas involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños y niñas que participan en actividades económicas en o por encima de los umbrales específicos de la edad, niños y niñas que participan en las tareas del hogar en o por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños, niñas involucrados en trabajos peligrosos.

<sup>xi</sup>El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.

<sup>xii</sup>Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) medios sobrenaturales y ii) compartir comida con alguien con VIH.

<sup>xiii</sup>Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.

<sup>xiv</sup>Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del sida se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que es VIH-positivo, (3) que no querrían mantenerlo en secreto si un miembro de la familia es VIH-positivo, y (4) que estarían dispuestas a cuidar en su propia casa a un miembro de la familia con sida.

<sup>xv</sup>Indicador específico de Paraguay

Encuesta de  
Indicadores  
Múltiples por  
Conglomerados

MICS  
Paraguay  
2016

