

Dosificación de Azitromicina Polvo para Suspensión Oral (PSO) y Tabletas basada en talla y peso

Julio de 2018

Bebes menores de 6 meses: TUO
(Tetraciclina unguento oftálmico)



Bebé

PSO (Polvo para Suspensión Oral)	
Talla (cm)	Dosificación (ml)
>138	25 ml
> 130-138	19 ml
> 122-130	16 ml
> 110-122	14 ml
> 98-110	12 ml
> 87-98	10 ml
> 76-87	8 ml
> 65-76	6 ml
> 54-65	4 ml
50-54	2 ml

Niños de ≥ 6 meses y $<$ de 7 años que reciben PSO (Polvo para Suspensión Oral) *



Niño

Tabletas
Talla (cm)

>138	
120 - 138	

Niños de ≥ 7 años y $<$ de 15 años que reciben tabletas



Adolescente

≥ 15 años: 4 tabletas



Adulto

*Nota: Aun cuando el individuo tenga al menos 7 años y lo suficientemente alto para que se le suministre una tableta, si hay alguna preocupación de que él o ella pueda tener problemas para tragar una tableta, se le deberá proporcionar el PSO

Guías de dosificación de Azitromicina

Julio de 2018

—

META

**CERO EVENTOS
ADVERSOS SERIOS
DEBIDO A ASFIXIA**

—

—
=

META

**MEJOR MENEJO DE
TRATAMIENTOS A
NIÑOS**

—

—

Dosificación por grupo poblacional para la Administración Masiva de Medicamentos (AMM) contra el tracoma	
Grupo meta para AMM	Formulación
Niños de 0 a < 6 meses	Tetraciclina ungüento oftálmico
Niños en edades entre 6 meses y < 7 años (independientemente de su talla) Individuos por debajo de 120 cm (independientemente de su edad) Individuos con dificultad para tragar tabletas o incómodos tomando tabletas	Polvo para suspensión oral (PSO) dosificada de acuerdo con la talla
Individuos con más de 120 cm de estatura y en edades entre 7 y < 15 años	Tabletas dosificadas de acuerdo con la talla
Individuos con 15 años o más	Dosis de 4 tabletas

Tratando niños con Azitromicina

Ningun niño debe ser forzado a tomar azitromicina.

Los lugares de distribución pueden ser intimidantes para los niños. Si el niño no coopera o está ansioso, el padre o tutor es la persona correcta para administrar la azitromicina al niño para disminuir su ansiedad.

Si un niño no coopera o está ansioso, el distribuidor debe instruir a los padres a llevar al niño a un lugar más tranquilo para administrarle la dosis con calma a la vista de distribuidor.

Mientras administra la azitromicina a un niño, NUNCA le tape la nariz, sacuda al niño o fuerce la cabeza hacia atrás para obligarlo a tragar.

Si el niño se resiste, el distribuidor deberá registrar que el niño rehusó y pasar a la siguiente persona en la fila.

Aun cuando el niño tenga al menos 7 años y sea lo suficientemente alto para suministrarle una tableta, si existe alguna preocupación de que el niño pueda tener dificultad para tragar la tableta, se le deberá proporcionar la suspensión oral (PSO).